



CONCIME ORGANO-MINERALE NPK (SO<sub>3</sub>) CON BORO (B) + 14C

**4-8-12 [10] + 14C**



TIPO DI CONCIME:  
CONCIME ORGANO-MINERALE NPK

FORMULAZIONE:  
GRANULARE

RIFERIMENTO ALLA LEGGE  
D. LGS. 75/2010

CONFEZIONI:  
SACCHI 25 Kg - BIG BAG 500 ÷ 600 Kg

AZOTO (N) TOTALE	4 %
AZOTO (N) ORGANICO	4 %
ANIDRIDE FOSFORICA (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) TOTALE	8 %
ANIDRIDE FOSFORICA (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) SOLUBILE NEGLI ACIDI MINERALI DI CUI ALMENO IL 55% DEL TITOLO DICHIARATO DI P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> E' SOLUBILE IN ACIDO FORMICO AL 2%	8 %
OSSIDO DI POTASSIO (K <sub>2</sub> O) SOLUBILE IN ACQUA A BASSO TENORE DI CLORO	12 %
ANIDRIDE SOLFORICA (SO <sub>3</sub> ) SOLUBILE IN ACQUA	10 %
BORO (B) SOLUBILE IN ACQUA	0,08 %
CARBONIO (C) ORGANICO DI ORIGINE BIOLOGICA	14 %
TASSO DI UMIFICAZIONE (H <sub>r</sub> )	40 %
CARBONIO ORGANICO (C) UMICO E FULVICO (Ha+Fa)	3 %

### CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

CONCIMI ORGANICI: CUOIO E PELLI IDROLIZZATI (PELLAMI) CON CONCENTRAZIONE MASSIMA IN MG/KG DI SOSTANZA SECCA DI CROMO (VI) = NON RILEVABILE.

CONCIMI MINERALI: FOSFATO NATURALE TENERO CON TENORE IN CADMIO < 90 MG/KG DI P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, SOLFATO DI POTASSIO OTTENUTO DA SALE GREZZO DI POTASSIO MEDIANTE UN PROCESSO DI ESTRAZIONE FISICA E CHE PUO' CONTENERE ANCHE SALI DI MAGNESIO.

MATRICI ORGANICHE: TORBA UMIFICATA

DOSI DI IMPIEGO CONSIGLIATE		
COLTURE	DOSI (Kg/ha)	IMPIEGO
OLIVO	500-800	Ripresa vegetativa-Dopo raccolta
VITE DA VINO	400-600	Ripresa vegetativa
VITE DA TAVOLA	500-700	Ripresa vegetativa
DRUPACEE, POMACEE	400-700	Ripresa vegetativa
ORTICOLE IN GENERALE	600-1000	Pre-semina-pre-trapianto
AGRUMI	400-800	Ripresa vegetativa-Dopo raccolta
ACTINIDIA	400-700	Ripresa vegetativa-Dopo raccolta
FLORICOLE ED ORNAMENTALI	600-900	Ripresa vegetativa
TABACCO	600-900	Pre-trapianto
NOCCIOLO	600-900	Autunno-Fine Inverno

NELL' UTILIZZO DELLE DOSI CONSIGLIATE PER LE SINGOLE CULTURE, IL QUANTITATIVO MINIMO E MASSIMO E' PRETTAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILE, IN RELAZIONE AI FABBISOGNI, AI LEVELLI DI FERTILITA' ED ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLE VARIE NORMATIVE.  
È PREFERIBILE INTERRARE IL PRODOTTO AD UNA PROFONDITÀ DI 15 CM CIRCA, PER FAVORIRE LA ZIONE FISICA E BIOLOGICA DELLA SOSTANZA ORGANICA.  
TENERE AL RIPARO DAI RAGGI DEL SOLE E DALLA PIOGGIA

