

GRANULARE

# CONCIME CE

## CONCIME NPK (SO<sub>3</sub>)

### 11-22-16 (15)

A BASSO TENORE DI CLORO



AZOTO (N) TOTALE	11,0 %
AZOTO (N) AMMONIACALE	8,7 %
AZOTO (N) UREICO	2,3 %
ANIDRIDE FOSFORICA (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) SOLUBILE NEL CITRATO AMMONICO NEUTRO E NELL'ACQUA	22,0 %
ANIDRIDE FOSFORICA (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) SOLUBILE IN ACQUA	19,5 %
OSSIDO DI POTASSIO (K <sub>2</sub> O) SOLUBILE IN ACQUA - A BASSO TENORE DI CLORO	16,0 %
ANIDRIDE SOLFORICA (SO <sub>3</sub> ) SOLUBILE IN ACQUA	15,0 %

FORMA FISICA: GRANULARE.  
FRAZIONE MINERALE: SOLFATO AMMONICO, PERFOSFATO SEMPLICE, SALI POTASSICI, UREA.

TIPO DI FERTILIZZANTE:  
CONCIME CE NPK

FORMULAZIONE:  
GRANULARE

RIFERIMENTO ALLA LEGGE  
REGOLAMENTO CE 2003/2003

CONFEZIONI:  
SACCHI 25 Kg - BIG BAG 500 ÷ 600 Kg

#### DOSI DI IMPIEGO CONSIGLIATE

COLTURE	DOSI (Kg/Ha)	IMPIEGO
VITE DA VINO	500-700	Fine inverno - ripresa vegetativa
VITE DA TAVOLA	900-1100	Fine inverno - ripresa vegetativa
CILIEGIO, MELO, PESCO, FRUTTIFERI	800-1000	Ripresa vegetativa
PATATA, POMODORO E ALTRE ORTIVE	600-800	Pre-semina o pre-trapianto, copertura
AGRUMI	500-700	Ripresa vegetativa
VIVAI	1000-1200	Copertura

NELL'UTILIZZO DELLE DOSI CONSIGLIATE PER LE SINGOLE COLTURE, IL QUANTITATIVO MINIMO E MASSIMO E' PRETTAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILE, IN RELAZIONE AI FABBISOGNI, AI LIVELLI DI FERTILITÀ ED ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLE VARIE NORMATIVE.  
TENERE AL RIPARO DAI RAGGI DEL SOLE E DALLA PIOGGIA

**Ormin**  
CONCIMI ORGANO-MINERALI