

GRANULARE

CONCIME CE

CONCIME NPK [SO₃]

12-12-17 [23]

A BASSO TENORE DI CLORO



AZOTO (N) TOTALE	12,0 %
AZOTO (N) AMMONIACALE	6,0 %
AZOTO (N) UREICO	6,0 %
ANIDRIDE FOSFORICA (P ₂ O ₅) SOLUBILE NEL CITRATO AMMONICO NEUTRO E NELL'ACQUA	12,0 %
ANIDRIDE FOSFORICA (P ₂ O ₅) SOLUBILE IN ACQUA	10,5 %
OSSIDO DI POTASSIO (K ₂ O) SOLUBILE IN ACQUA - A BASSO TENORE DI CLORO	17,0 %
ANIDRIDE SOLFORICA (SO ₃) SOLUBILE IN ACQUA	23,0 %

FORMA FISICA: _____ GRANULARE.
 FRAZIONE MINERALE: _____ CONCIME CE 18/46, SOLFATO AMMONICO, PERFOSFATO SEMPLICE, SALI POTASSICI, UREA.

DOSI DI IMPIEGO CONSIGLIATE

COLTURA	DOSI (Kg/Ha)	IMPIEGO
VITE DA VINO	400-500	Fine inverno - ripresa vegetativa
VITE DA TAVOLA	900-1000	Fine inverno - ripresa vegetativa
OLIVO	200-300	Piante in allevamento
	600-700	Piante in produzione
ORTIVE IN GENERALE	600-700	Pre-semine o pre-trapianto
	400-500	Copertura
AGRUMI	400-600	Fine estate - autunno o dopo raccolta
MELO, PERO, ACTINIDIA, PESCO CILIEGIO, SUSINO, ALBICOCCO	500-600	Fine estate - autunno o dopo raccolta
POMODORO	600-900	Impianto
GIRASOLE	400-600	Pre-semine
PATATA	600-1000	Pre-semine
PIANTE ORNAMENTALI ARBUSTI DA FIORE	200 - 300	Fine inverno - inizio estate

NELL'UTILIZZO DELLE DOSI CONSIGLIATE PER LE SINGOLE COLTURE, IL QUANTITATIVO MINIMO E MASSIMO E' PRETTAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILE, IN RELAZIONE AI FABBISOGNI, AI LIVELLI DI FERTILITA' ED ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLE VARIE NORMATIVE.
 TENERE AL RIPARO DAI RAGGI DEL SOLE E DALLA PIOGGIA

TIPO DI FERTILIZZANTE:
CONCIME CE NPK

FORMULAZIONE:
GRANULARE

RIFERIMENTO ALLA LEGGE
REGOLAMENTO CE 2003/2003

CONFEZIONI:
SACCHI 25 Kg - BIG BAG 500 ÷ 600 Kg

Ormin
 CONCIMI ORGANO-MINERALI