

GRANULARE

# CONCIME CE

## CONCIME NPK (SO<sub>3</sub>)

### 12-12-17 (23)

A BASSO TENORE DI CLORO



TIPO DI FERTILIZZANTE:  
CONCIME CE NPK

FORMULAZIONE:  
GRANULARE

CONFEZIONI:  
SACCHI 25 Kg - BIG BAG 500 ÷ 600 Kg

AZOTO (N) TOTALE	12,0 %
AZOTO (N) AMMONIACALE	6,0 %
AZOTO (N) UREICO	6,0 %
ANIDRIDE FOSFORICA (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) SOLUBILE NEL CITRATO AMMONICO NEUTRO E NELL'ACQUA	12,0 %
ANIDRIDE FOSFORICA (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) SOLUBILE IN ACQUA	10,5 %
OSSIDO DI POTASSIO (K <sub>2</sub> O) SOLUBILE IN ACQUA - A BASSO TENORE DI CLORO	17,0 %
ANIDRIDE SOLFORICA (SO <sub>3</sub> ) SOLUBILE IN ACQUA	23,0 %

FORMA FISICA: GRANULARE.  
FRAZIONE MINERALE: CONCIME CE 18/46, SOLFATO AMMONICO, PERFOSFATO SEMPLICE, SALI POTASSICI, UREA.

DOSI DI IMPIEGO CONSIGLIATE		
COLTURA	DOSI (Kg/Ha)	IMPIEGO
VITE DA VINO	400-500	Fine inverno - ripresa vegetativa
VITE DA TAVOLA	900-1000	Fine inverno - ripresa vegetativa
OLIVO	200-300	Piante in allevamento
	600-700	Piante in produzione
ORTIVE IN GENERALE	600-700	Pre-semine o pre-trapianto
	400-500	Copertura
AGRUMI	400-600	Fine estate - autunno o dopo raccolta
MELO, PERO, ACTINIDIA, PESCO CILIEGIO, SUSINO, ALBICOCCO	500-600	Fine estate - autunno o dopo raccolta
POMODORO	600-900	Impianto
GIRASOLE	400-600	Pre-semine
PATATA	600-1000	Pre-semine
PIANTE ORNAMENTALI ARBUSTI DA FIORE	200 - 300	Fine inverno - inizio estate

NELL'UTILIZZO DELLE DOSI CONSIGLIATE PER LE SINGOLE COLTURE, IL QUANTITATIVO MINIMO E MASSIMO E' PRETTAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILE, IN RELAZIONE AI FABBISOGNI, AI LIVELLI DI FERTILITA' ED ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLE VARIE NORMATIVE.  
TENERE AL RIPARO DAI RAGGI DEL SOLE E DALLA PIOGGIA

**Crmin**<sup>®</sup>  
CONCIMI ORGANO-MINERALI