5-10 [10,5] + 30



| AZOTO (N) TOTALE | 5,0 % |
|--|---------------|
| AZOTO (N) ORGANICO | 5,0 % |
| ANIDRIDE FOSFORICA (P205) TOTALE | 10,0 % |
| OSSIDO DI CALCIO (CaO) TOTALE | 10,5 % |
| CARBONIO (C) ORGANICO DI ORIGINE BIOLOGICA | 30,0 % |

FRAZIONE ORGANICA: LETAME ESSICCATO BOVINO PROVENIENTE DA ALLEVAMENTI

NON INDUSTRIALI, FARINA DI CARNE, FARINA DI OSSA

FRAZIONE MINERALE: ___ FOSFATO NATURALE TENERO CON TENORE IN CADMIO

< 90 mg/kg di P205, solfato di Calcio solo di Origine naturale.

TIPO DI FERTILIZZANTE: CONCIME ORGANO-MINERALE NP FORMULAZIONE:

PELLET Ø ± 4 mm L ± 9 mm

RIFERIMENTO ALLA LEGGE **D. LGS. 75/2010**

CONFEZIONI:

SACCHI 25 Kg - BIG BAG 500 ÷ 600 Kg

| DOSI DI IMPIEGO CONSIGLIATE | |
|--|----------------|
| COLTURE | DOSI (Q.li/Ha) |
| AGRUMI | 16 |
| COLTURE ORTICOLE E FLORICOLE In pieno campo | 7-14 |
| COLTURE ORTICOLE E FLORICOLE In serra o tunnel | 15-20 |
| COLTURE ARBOREE E DA FRUTTO | 8-15 |
| VITE DA VINO E DA TAVOLA | 8-15 |
| FRUMENTO TENERO E DURO | 4-7 |
| GIRASOLE | 8-10 |

NELL' UTILIZZO DELLE DOSI CONSIGLIATE PER LE SINGOLE COLTURE, IL QUANTITATIVO MINIMO E MASSIMO E' PRETTAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILE, IN RELAZIONE AI FABBISOGNI, AI LIVELLI DI FERTILITÀ ED ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLE VARIE NORMATIVE. È PREFERIBILE INTERRARE IL PRODOTTO AD UNA PROFONDITÀ DI 15 CM CIRCA, PER FAVORIRE L'AZIONE FISICA E BIOLOGICA DELLA SOSTANZA ORGANICA. TENERRE AL RIPARO DAI RAGGI DEL SOLLE E DALLA PIOGGIA

