

GRANULARE

# ORTIVO

CONCIME ORGANO-MINERALE NPK (SO<sub>3</sub>) + C

## 8-12-16 [30] + 7,5



<b>AZOTO (N) TOTALE</b>	<b>8,0 %</b>
AZOTO (N) ORGANICO	1,0 %
AZOTO (N) AMMONIACALE	7,0 %
<b>ANIDRIDE FOSFORICA (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) TOTALE</b>	<b>12,0 %</b>
ANIDRIDE FOSFORICA (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) SOLUBILE NEL CITRATO AMMONICO NEUTRO E NELL'ACQUA	10,0 %
ANIDRIDE FOSFORICA (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) SOLUBILE IN ACQUA	9,0 %
<b>OSSIDO DI POTASSIO (K<sub>2</sub>O) SOLUBILE IN ACQUA</b>	<b>16,0 %</b>
<b>ANIDRIDE SOLFORICA (SO<sub>3</sub>) SOLUBILE IN ACQUA</b>	<b>30,0 %</b>
<b>CARBONIO (C) ORGANICO DI ORIGINE BIOLOGICA</b>	<b>7,5 %</b>

FRAZIONE ORGANICA: — MISCELA DI CONCIMI ORGANICI AZOTATI, TORBA UMIFICATA  
FRAZIONE MINERALE: — SOLFATO AMMONICO, PERFOSFATO SEMPLICE, SALI POTASSICI,  
CONCIME CE 18/46.

TIPO DI FERTILIZZANTE:  
**CONCIME ORGANO-MINERALE NPK**

FORMULAZIONE:  
**GRANULARE**

RIFERIMENTO ALLA LEGGE  
**D. LGS. 75/2010**

CONFEZIONI:  
**SACCHI 25 Kg - BIG BAG 500 ÷ 600 Kg**

### DOSI DI IMPIEGO CONSIGLIATE

COLTURE	DOSI (Kg/Ha)	IMPIEGO
<b>ORTIVE IN GENERALE</b>	<b>700-800</b>	Pre-semina o pre-trapianto
	<b>400-500</b>	Copertura
<b>POMODORO</b>	<b>600-800</b>	Presemina o pre-trapianto
<b>MELONE, ANGIURIA</b>	<b>500-600</b>	Pre-trapianto
<b>TABACCO</b>	<b>300-700</b>	Pre-trapianto
<b>VITE</b>	<b>300-400</b>	Fine estate, autunno o dopo la raccolta
<b>PESCO</b>	<b>500-600</b>	Fine estate, autunno o dopo la raccolta
<b>AGRUMI</b>	<b>400-600</b>	Fine estate, autunno o dopo la raccolta
<b>ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO</b>	<b>300-400</b>	Fine estate, autunno o dopo la raccolta
<b>ACTINIDIA</b>	<b>400-600</b>	Fine estate, autunno o dopo la raccolta
<b>MELO, PERO</b>	<b>400-600</b>	Fine estate, autunno o dopo la raccolta
<b>FRAGOLA</b>	<b>400-600</b>	Preparazione terreno o Pre-trapianto
<b>PIANTE ORNAMENTALI, ARBUSTI DA FIORE</b>	<b>50-60 g/mq</b>	Fine inverno, inizio estate

NELL'UTILIZZO DELLE DOSI CONSIGLIATE PER LE SINGOLE COLTURE, IL QUANTITATIVO MINIMO E MASSIMO E' PRETTAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILE, IN RELAZIONE AI FABBISOGNI, AI LIVELLI DI FERTILITÀ ED ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLE VARIE NORMATIVE. È PREFERIBILE INTERRARE IL PRODOTTO AD UNA PROFONDITÀ DI 15 CM CIRCA, PER FAVORIRE L'AZIONE FISICA E BIOLOGICA DELLA SOSTANZA ORGANICA. TENERE AL RIPARO DAI RAGGI DEL SOLE E DALLA PIOGGIA

**Ormin**  
CONCIMI ORGANO-MINERALI